

마약성 진통제 “옥시코돈” 안전사용 안내서 (의사용)



식품의약품안전처에서 ‘옥시코돈(정제)’의 주의사항에 대해 알려드립니다.

1. ‘옥시코돈’은 어떤 약물인가요?

- ‘옥시코돈’은 「마약류 관리에 관한 법률」에 의하여 **마약(오피오이드계)**으로 지정되어 있는 약물로서, **신체적·정신적 의존성**을 야기할 수 있습니다.

2. ‘옥시코돈’은 어떤 경우에 사용하는 것인가요?

- **비약물적 치료 또는 비마약성 진통제(아세트아미노펜, 이부프로펜 등) 사용을 우선**하고 효과가 없거나 비마약성 진통제 사용에 제한이 있는 경우에 사용합니다.
- ‘옥시코돈’은 마약성 진통제의 사용을 필요로 하는 **중등도 및 심한 통증의 완화의 목적으로** 사용합니다.

3. ‘옥시코돈’은 얼마나 투여하나요?

- 투여량은 환자 개개인의 통증의 정도, 환자의 상태, 과거에 투여한 약물이나 현재 병용하는 약물 등에 따라 조절해야 합니다.
- 통증에 효과가 있는 가장 낮은 투여 용량을 선택하며, 일반적으로 **초회용량은 1회 용량으로 5mg~10mg로 투여를 시작**합니다.
- 제제 특성에 따라 4~6시간(속효성), 12시간(서방형) 마다 1정씩 투여합니다.

4. ‘옥시코돈’ 사용 시 주의사항은 무엇인가요?

- ‘옥시코돈’은 마약성 진통제로서 **오남용 가능성이 높은 약물임**을 항상 인식해야 합니다.
- **기본적으로 만 18세 미만 소아 및 청소년에게는 사용하지 않습니다.**(비암성 만성통증에 한함)
- 환자의 알코올 및 중독성 약물 사용력에 대한 정보를 철저히 파악해야 합니다.
- 오남용의 우려가 있으므로 장기처방(1개월 초과)하지 않는 것이 바람직합니다.
- 이 약은 부수고, 씹고, 흡입하거나, 용해시킨 물질을 주사함으로써 남용될 수 있으므로 처방 시 구체적인 복용 방법, 복용 시 주의사항 등을 신중히 설명하고, 투여 목적 이외의 사용 또는 이 약이 불필요해졌을 경우 타인에게 양도를 하지 않도록 병원 또는 약국에 반납하는 등의 처치에 대해 적절히 지도하도록 합니다.

※ 의사는 의료용 마약류의 과다 중복 처방 등 오남용을 방지하기 위하여 “**마약류 의료쇼핑 방지 정보망** (data.nims.or.kr)”을 통해 **환자의 의료용 마약류 투약 내역을 조회**할 수 있으며 (열람사실 조회 전 환자에게 통보) 「마약류 관리에 관한 법률」제30조제2항에 따라 그 투약내역을 확인한 결과 오남용이 우려되는 경우 의사가 의료용 마약류를 처방 또는 투약을 하지 않을 수 있습니다.

